

280 mm

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een na-oogst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 CtgB juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden:

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van Phalaenopsis is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/ 2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

¹ Toepassen met behulp van een geautomatiseerde spuitinstallatie.

Om schuimvorming te voorkomen, eerst de tank half vullen met water en het product voorzichtig toevoegen alvorens de tank af te vullen met water. Het middel alleen toepassen in snijbloemen van roos als de bloemen vooraf behandeld zijn op de bloemkweek. Het middel kan negatieve effecten hebben op bladeren van tropische planten. Tussen gewassen en gewascultures bestaan grote verschillen in gewasgevoeligheid. Als nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst op kleine schaal een proefbehandeling uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

CHARGENR. / THT.

Geproduceerd door:
Chrysal International BV
Postbus 5300, 1410 AH Naarden
www.chrysal.com



8 719400 020625 >

Geproduceerd door:
Chrysal International BV
Postbus 5300, 1410 AH Naarden
www.chrysal.com



E033100



VIVA

1L

DIP & SPRAY

VOOR KLEURBEHOUD & BLOEMINDUCTIE

Viva kan gebruikt worden door telers om de kwaliteit van snijbloemen en potplanten na de oogst te verbeteren. Het kan worden gebruikt als een dip- of spuitbehandeling. De effecten, die kunnen worden gerealiseerd, zijn afhankelijk van de soort snijbloem en potplant. De effecten op de meest geteste snijbloemen en potplanten worden hieronder beschreven, maar positieve effecten van het spuiten van Viva op het vaasleven zijn ook waargenomen bij *Acanthus*, *Aster*, *Dahlia*, *Eranthis*, *Lavatera* en *Ornithogalum*.

Rosa: Om de houdbaarheid te verbeteren en voor een betere kleurontwikkeling, met name bij rode rozen, moeten de bloemen bij voorkeur worden gedipt.

Chrysanthemum: Om bladvergeling bij chrysanten tegen te gaan dienen de bladeren gedipt te worden.

Anthurium: De houdbaarheid van Anthurium wordt aanzienlijk verlengd door het spuiten van Viva over de bloemen. In sommige cultivars kan de bloemkleur beïnvloed worden:

terwijl rode kleuren kunnen worden geïntensiveerd, kan soms ook vergroening van de bloem worden waargenomen.

Tropische bladeren en bloemen: Goede resultaten zijn verkregen met het bespuiten van Anthurium, Monstera en Philodendron bladeren en van Calathea, Curcuma, Heliconia en Strelitzia bloemen. Hoewel de resultaten kunnen variëren, wordt de houdbaarheid van deze tropische bladeren en bloemen in veel gevallen sterk verbeterd.

Rosa: Het bespuiten van potrozen kan bladvergeling tegengaan. Dit is vooral zichtbaar bij de onderste bladeren. Tevens wordt de scheutontwikkeling gestimuleerd en wordt de kleurintensiteit verbeterd bij rode rozen.

Anthurium en Calathea: Het bespuiten van Anthurium en Calathea kan de bloeiduur sterk verlengen.

Phalaenopsis: Toename van het aantal bloeiende takken door bespuiting tijdens takinductie

Sniïbloemen

Dosering: 4 ml per liter. Dip de bloemen gedurende enkele seconden onder in Viva oplossing bespuit ze totdat de vloeistof eraf loopt. Dippen geeft meestal betere resultaten dan spuiten, maar moet voorzichtig worden uitgevoerd om mechanische schade te voorkomen.

Dosering: 4 ml per liter. Bespuit afleverbare potplanten bladnat vlak voor het verlaten van de kwekerij. Spuit direct op de bladeren, knoppen en bloemen. Vermijd overmatig spuiten en spuiten op grond of andere substraten.

Dosering: 8 ml per liter. Bespuit planten bladnat tijdens de takinductie.

Bij de aanbevolen doelingen is cytotoxiciteit niet waargenomen. Het wordt echter sterk aangeraden om kleinschalige testen met Viva uit te voeren voorafgaand aan grootschalig gebruik. Voor dippen wordt geadviseerd om verse kant-en-klare oplossing dagelijks aan te maken. Gebruik altijd schoon water om de kant-en-klare dip-oplossing te bereiden. Gebruikte dip-oplossing kan worden aangevuld met verse ongebruikte dip-oplossing gedurende dezelfde dag. Aan het eind van de dag kan de gebruikte dip-oplossing op het riool geloosd worden. Gebruikers moeten de volgende beschermende kleding dragen: een shirt met lange mouwen, een lange broek, diepe schoenen met sokken en chemisch resistente handschoenen. Het bespuiten van afleverbare snijbloemen en potplanten dient in een spuitfunnel of -cabine uitgevoerd te worden met goede afzuiging om blootstelling van de gebruiker en omstanders zo veel mogelijk te beperken. Het bespuiten van Phalaenopsis dient uitgevoerd te worden met behulp van een geautomatiseerde spuitinstallatie.

Viva dient bewaard te worden in een koele en donkere plaats. Bij kamertemperatuur kan een houdbaarheid van 2 jaar gegarandeerd worden. Het product is normaal gesproken een heldere transparante vloeistof. Onder bepaalde omstandigheden kan de oplossing echter troebel worden. Deze troebelheid is niet van invloed op de homogeniteit en werkzaamheid van het product.